

# Lincomicin 4% RK Vet.

**Antibiótico.**  
**Polvo para uso oral.**



## FORMULA

**Cada 100 g contiene:** Lincomicina base (como Clorhidrato) 4 g;  
Excipientes c.s.

## INDICACIONES

**Parrilleros** = control de enteritis necrótica causada por *Clostridium spp* y otros microorganismos susceptibles.

**Porcinos** = Neumonía por *Mycoplasma hyopneumoniae*, Enteropatía proliferativa (ileitis) por *Lawsonia intracellularis*, Disentería porcina asociada a *Brachyspira hyodysenteriae*.

## DOSIS

**Pollos Parrilleros:** Tratamiento de enteritis necrótica: 50 a 100 g de Lincomicin 4 % RK Vet por cada tonelada de alimento.

**Porcinos:** Tratamiento de Neumonía por Micoplasmas: 5 kg de Lincomicin 4 % RK Vet por cada tonelada de alimento durante 3 semanas seguidas.

Tratamiento de Disentería porcina y de Enteropatía proliferativa: 2,5 kg de Lincomicin 4 % RK Vet por cada tonelada de alimento durante 3 semanas o hasta la desaparición de los síntomas.

La administración debe ser continua.

El producto debe ser preparado para su administración diariamente y utilizado dentro de las 24 horas de preparado. Preparar primero una premezcla con 5 a 10 kg de alimento y luego incorporar esta premezcla a la ración. Debe asegurarse un mezclado homogéneo con el alimento. El alimento medicado será la única ración durante los días que dure el tratamiento.

## CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES

No administrar a animales con antecedentes de hipersensibilidad a las Lincosamidas.

Los efectos de Lincomicina sobre la performance reproductiva y la gestación no han sido establecidos; sin embargo la droga no ha sido vinculada con teratogénesis.

## EFFECTOS COLATERALES

Los porcinos durante los primeros tres días de tratamiento pueden presentar ablandamiento de heces o diarrea. Irritación e inflamación de ano y/o vulva suelen estar asociados con los cambios en las heces. Más raramente algunos animales pueden presentar enrojecimiento de la piel e irritabilidad. Estos síntomas desaparecen espontáneamente sin necesidad de interrumpir el tratamiento. Si los síntomas se tornan más severos, discontinuar el tratamiento.

## PRECAUCIONES

No suministrar alimento conteniendo Lincomicin 4 % RK Vet a equinos, rumiantes, conejos y roedores domésticos por el riesgo de trastornos gastrointestinales severos.

El producto no es tóxico ni perjudicial para el medio ambiente. No requiere condiciones especiales para su almacenamiento y transporte. Inutilizar los envases una vez usado el producto. Tiempo que debe transcurrir entre el último día de tratamiento y el sacrificio del animal para consumo humano:

**Pollos Parrilleros:** 2 días.

**Porcinos:** 2 días. Si se adicionan más de 2,5 kg por tonelada, el período de retiro es de 6 días.

**No administrar a ponedoras en producción de huevos para consumo humano.**

**No exponer a la luz solar directa. Conservar en lugar seco entre 4° y 30° C. Mantener fuera del alcance de los niños. Centro Nacional de Intoxicaciones – Tel.: 0800-333-0160.**

 CHEMO

 senasa

ROMIKIN S.A.U.  
Paraguay 1535 - C1061ABC - Buenos Aires - Argentina.  
Tel.: (11) 4872-1200. Fax (11) 4872-1201  
E-mail: consultas@romikin.com.ar

Inscripción N° 12128  
Certificado N° 11-112  
Directora Técnica: Andrea Sandra López, Médica Veterinaria,  
Matrícula N° 6735.

Lote N°:

Fecha de Elaboración:

Fecha de Vencimiento:

INDUSTRIA ARGENTINA

PESO NETO

20 Kg