

# Tilmicosin 20% RK Vet.

**Antibiótico.**  
**Polvo para uso oral.**



## FÓRMULA

**Cada 100 g contiene:** Cada 100 g contiene: Tilmicosina base como fosfato – 20 g; Excipientes c.s.

## ACCIÓN

Antibiótico bacteriostático con actividad sobre gérmenes Gram positivos, Gram negativos y Micoplasmas.

## INDICACIONES

Prevención y tratamiento de enfermedad respiratoria en Aves asociada a *Mycoplasma gallisepticum* y *M. synoviae* y de enfermedad respiratoria en Porcinos asociada a *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida* y otros gérmenes sensibles a la Tilmicosina.

## ADMINISTRACIÓN

Oral, mezclado con el alimento.

## DOSIS

**Salvo indicación del Médico Veterinario actuante administrar de 7 a 10 días.**

**Porcinos:** 1 a 2 kg de Tilmicosin 20 RK Vet. por cada tonelada de alimento cada 24 horas.

**Aves:** 750 g a 1 kg de Tilmicosin 20 RK Vet. por cada tonelada de alimento cada 24 horas.

Se debe preparar primero una pre mezcla con 20 - 50 kg de alimento y luego agregar esta pre mezcla a la ración.

Controlar bien el mezclado al agregar el producto.

## CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

El producto sólo debe ser administrado por la vía oral. No debe emplearse la vía parenteral en porcinos por su posible toxicidad cardiovascular. En esta especie la vía oral es la única indicada. El producto es potencialmente fatal para equinos. La Epinefrina incrementa la mortali-

dad en porcinos causada por Tilmicosina. No administrar a animales con insuficiencia renal aguda o glomerulonefritis.

No administrar a ponedoras en producción de huevos para consumo humano.

## EFFECTOS COLATERALES

El producto no los presenta empleado en la dosis y modo de administración indicados. Raramente pueden presentarse reacciones alérgicas y síntomas de intolerancia intestinal.

## PRECAUCIONES

El operador debe evitar tomar contacto o inhalar el producto en el momento de su preparación. Evitar el contacto con ojos y mucosas. Se debe emplear guantes y mascarilla durante su manipulación. Lavar cuidadosamente las manos luego de manipular el producto. No exponer a la luz solar directa.

**Tiempo que debe transcurrir entre el último día de tratamiento y el sacrificio del animal para consumo humano: Porcinos y Pollos parrilleros = 14 días.**

**No administrar en aves ponedoras cuyos huevos se destinen al consumo humano.**

**No administrar durante la gestación y lactancia.**

**Conservar en lugar seco entre 4° y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños. Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160.**

 CHEMO

ROMIKIN S.A.U.  
Paraguay 1535 - C1061ABC - Buenos Aires - Argentina.  
Tel.: (11) 4872-1200. Fax (11) 4872-1201  
E-mail: consultas@romikin.com.ar

 senasa

Inscripción N° 12128  
Certificado N° 09-199  
Directora Técnica: Andrea Sandra López, Médica Veterinaria,  
Matrícula N° 6735.

Lote N°:

Fecha de Elaboración:

Fecha de Vencimiento:

PESO NETO

25 Kg

INDUSTRIA ARGENTINA